



ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА
ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ

**ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
У ВОЛИНСЬКІЙ ОБЛАСТІ**

вул.Поліська Січ,10, м. Луцьк, 43020, тел. (0332) 246367, 729381, факс 246402 e-mail: gu.dpss.volyn@i.ua
код ЄДРПОУ 40317441

№ 13.01-07/2109 Бз 14.04.2020р.

Головам ОТГ
Володимир-Волинського
району

Природні умови району та наближення теплого періоду сприятливі для масового розповсюдження кровосисних комах. Аналізуючи виконання протималарійних гідротехнічних міроприємств свідчить, що більшість меліоративних каналів, утримується в незадовільному санітарно-технічному стані. Майже всі меліоративні канали заросли водою рослинністю, кущами, замулені. Очистка, скошення рослинності, як ложа, так і берегів, особливо в місцях швидкої течії води проводяться слабо, або взагалі не проводяться. В цьому році їх санітарно-технічний стан не кращий, внаслідок чого виникає загроза масового нападу мошки тварин, що може призвести до їх захворювання та загибелі.

Нападаючи на тварин, мошка залазить в очі, вуха, проникає в верхні дихальні шляхи. Не відчутні в перший момент укуси мошки в дальнішому викликають зуд, болючість, набряки, місцеве і загальне підвищення температури. Мошка поглинає велику кількість крові. Слина мошки містить гемолітичний яд і попадаючи в організм тварини у великій кількості при масовому нападі мошки розвивається симуліотоксикоз. Тварини спочатку непокоються, потім настає пригнічення, появляється сальвівація (слиновиділення), набряк язика, підщелепового простору, підгрудка, дихання стає важким, з'являються хрипи, збільшуються лімфовузли. Тварини рухаються в'яло, більше лежать, з'являється фібрилярне скорочення м'язів. Інтوكсикація розвивається швидко, смерть настає на протязі 1-2 днів.

Нападу мошки підлягають всі види тварин, але найбільше велика рогата худоба та коні.

Захворювання симуліотоксикозом, як правило, носить масовий характер, відхід серед хворих, якщо не надавати кваліфіковану ветеринарну допомогу, сягає 10-20 відсотків. Хворі тварини різко втрачають в масі, у корів до 50 відсотків знижується молочна продуктивність.

Мошки можуть механічним шляхом передавати збудників таких захворювань як сибірка, енцефаліт, туляремія та ін..

Лікування симптоматичне: серцеві препарати, дихальні аналептики, атропін, внутрішньовенне введення глюкози, хлористого кальцію, фізіологічного розчину, холодні оцтові компреси, спокій.

З метою запобігання уражень тварин необхідно провести обстеження швидкоплинних водойм на предмет заселення личинок мошки. Вимагаю від власників тварин дотримання режимів випасання тварин в період найменшої активності комах. Найкраще випасати худобу в день з одинадцятої до сімнадцятої години, на підвищених ділянках, які добре провітрюються та віддалені від проточних водойм і заболочених місць. При надзвичайній активності мошки, тварин негайно ставити в стійло, періодично проводити дезінсекцію тваринницьких приміщень, території ферм, індивідуальних господарств.

Головам ОТГ, старостам сіл, керівникам господарств, забезпечити негайне проведення в належний санітарно-технічний стан внутрішньогосподарські меліоративні канали, для цього провести очищення їх від хламу – особливо в місцях швидкої течії води, скошування рослинності.

Широко проводити масово - роз'яснювальну роботу серед населення про можливість нападу кровосисних комах та заходи щодо його профілактики.

У зв'язку з неблагополучним прогнозом по пасовищній тетанії у весняний період провести профілактичну обробку поголів'я проти цього захворювання, щоб не допустити захворювань та загибелі сільськогосподарських тварин.

Про кожний випадок нападу гнусу та пасовищній тетанії негайно інформувати Держпродспоживслужбу району.

Інформацію просимо розмістити на офіційному сайті.

Додаток: на 4 арк..

Начальник
Володимир-Волинського
районного управління



Надія ЛОЗОВИЦЬКА