

# ПТАШИНИЙ ГРИП - різновид грипу, що уражає птахів (особливо сприйнятливі кури та індички), а також деякі види ссавців.




Природним резервуаром вірусу пташиного грипу є мігруючі водоплавні птахи - найчастіше дикі качки.



Зараження у птахів відбувається респіраторним та респіраторно-фекальним шляхом або через шлунково-кишковий тракт.



Віруси пташиного грипу можуть інфікувати інші види тварин, а також людей. Люди заражаються пташиним грипом при тісному контакті з хворою домашньою птицею під час утримання її, забою і обробки.



## ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД

- Від 20 годин до кількох діб, далі температура підвищується до 43–44°C.
- Птиця стає пригніченою, яєчна продуктивність різко падає, спостерігаються порушення у роботі органів травлення та дихання, гребінь та сережки набувають синюшного забарвлення і вже протягом перших двох днів до 80–100% птиці гине.



**Обов'язково дотримуватись правил особистої гігієни при догляді за птицею**



## ЗАПОБІГАННЯ ЗАХВОРЮВАННЮ НА ПТАШИНИЙ ГРИП

- Купівлю птиці здійснювати в місцях санкціонованої торгівлі тільки при наявності ветеринарних супровідних документів.
- Виключити можливість контакту домашньої птиці з дикою, в тому числі синантропною (голуб, горобець, сорока, ворона тощо)
- Проводити ретельне очищення та дезінфекцію всіх приміщень і території, послід та підстилку спалювати або обеззаражувати біотермічним методом.
- Надавати доступ спеціалістам ветеринарної медицини для проведення клінічного огляду та необхідних профілактичних щеплень та обробок свійської птиці.



У разі появи ознак захворювання чи незвичної поведінки птиці, у випадку її масової загибелі необхідно терміново сповістити Маловисківське управління Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області та Маловисківську районну державну лікарню ветеринарної медицини за телефонами 5-13-97, 5-19-59!