Повідомлення

про застосування засобів захисту рослин

Суб'єкт господарювання: «АГРО Л В ЛІМІТЕД, ТЗОВ»
Територіальна громада: Бісковицька сільська ОТГ
Адміністративна рада: Бісковицька
Місцевість: Самбірський район, Львівська обл., Самбір
Староста: Яремко Михайло Михайлович

З метою дотримання відповідальності та відкритості перед місцевими жителями та виконання положень нормативно-правових документів, що регулюють використання пестицидів у сільськогосподарській діяльності, компанія «Continental Farmers Group» інформує Вас про проведення технологічних операцій з обприскування сільськогосподарських культур на своїх полях (Додаток 2) згідно з вказаним графіком (Додаток 1)

Для СМС-інформування рекомендуємо зареєструватись на «Карті Бджоляра» - https://honey.cfg.com.ua/

ВАЖЛИВО: Компанія в якості засобів захисту рослин використовує лише зареєстровані препарати, дозволені на території України, у нормах та за умов, які діють згідно чинного законодавства, зокрема – згідно ст. 21 ЗУ «Про захист рослин», ст. 11 ЗУ «Про пестициди і агрохімікати» та ст. 30, 37-40 ЗУ «Про бджільництво».

У випадку виникнення несприятливих погодних умов вказані дати можуть бути перенесені на найближчий можливий термін проведення технологічних операцій, про що вас буде додатково проінформовано.

Згідно «Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України №338 від 19.02.2021 року, **просимо Вас довести зміст цього повідомлення до відома власників пасік шляхом його опублікування на офіційній інтернет-сторінці органу місцевого самоврядування** *або в засобах масової інформації місцевого рівня або оголошенням завчасного повідомлення по радіо та/або телебаченню місцевого рівня, а також шляхом його надсилання особистим повідомленням на телефон чи на електронну адресу, зазначеної під час реєстрації або кочівлі пасіки.*

З повагою, «Continental Farmers Group»
Гаряча лінія 0 800 508 805

З листом ознайомлений:

_____ _____
(дата) (підпис)

Додаток 1. Графік технологічних операцій

Поле SM_SAbisk01, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 9.9 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk06, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 27.1 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk07, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 18.9 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk04, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 11.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk08, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 23.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk03, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 151.0 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk02b, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 5.6 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Поле SM_SAbisk10, Бісковицька рада - Самбірський район, Соя, 18.5 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
14 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
14 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК
14 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК

Додаток 2. Карта полів

Додаток 3. Контакти відповідальної особи

Ім'я та прізвище	Поле / дата	Контактний телефон	Е-пошта
Симошин Микола Миколайович	SM_SAbisk01 / 14 квіт. SM_SAbisk06 / 14 квіт. SM_SAbisk07 / 14 квіт. SM_SAbisk04 / 14 квіт. SM_SAbisk08 / 14 квіт. SM_SAbisk03 / 14 квіт. SM_SAbisk02b / 14 квіт. SM_SAbisk10 / 14 квіт.	—	msymoshyn@cfg.com.ua

Додаток 4, класифікація препаративних форм пестицидів

Продукти випускаються у рідких та твердих формах. Основні рідкі форми препаратів:

- ВК, ВР — водні розчини
- КС, СК, ВСК — концентрати суспензій
- КЕ — концентрати емульсій
- МКЕ — масляні концентрати емульсій
- ВЕ — водні емульсії
- КД — концентрат, що диспергується
- СЕ — суспоемульсії
- МЕ — мікроемульсії
- ККР — концентрати колоїдних розчинів
- МС — масляні суспензії
- МД — масляні дисперсії
- МК — масляні концентрати
- МКС — мікрокапсульовані суспензії

Найбільш вживані тверді форми препаратів:

- ВДГ — водорозчинні гранули (гранули, що диспергуються у воді)
- КГ — капсульовані гранули
- КП — контактний порошок
- ПЕ — порошок, що емульгується
- ВП — водорозчинний порошок
- ЗП — порошок, що змочується
- Таб — таблетки