Додаток 1. Графік технологічних операцій

Поле SM_GOvely02, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 33.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely11, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 30.1 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely12, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 11.8 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely04, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 29.6 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely05, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 67.7 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely17, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 35.5 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely14, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 80.6 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely15, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 41.3 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely16, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 25.6 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely07, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 39.7 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely08, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 31.1 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely13, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 6.3 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely35, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 11.6 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely01, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 17.0 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Поле SM_GOvely03, Великолюбіньська рада - Городоцький район, Соя, 5.2 га (план)

Дата	Назва препарату	Вміст діючих речовин	Група пестицидів	Ступінь токсичності	Термін дії препарату	Рекомендований термін ізоляції бджіл	Препаративна форма
16 квіт. — 21 квіт.	Флузіон (Банка 0,5 кг)	Флуміоксазин 510 г/кг	Інше	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	ВДГ
16 квіт. — 21 квіт.	Аквареді (Банка 1 л)	_Купрум (Cu) , Ферум (Fe) , Калій водорозчинний	Інше	Малотоксичні речовини	—	24 години	ВК
16 квіт. — 21 квіт.	Напалм (Каністра 20 л)	Гліфосат 450 г/л	Гербіцид	Середньотоксичні речовини	—	48 годин	РК

Додаток 2. Карта полів

Додаток 3. Контакти відповідальної особи

Ім'я та прізвище	Поле / дата	Контактний телефон	E-пошта
Одноріг Андрій Андрійович	SM_GOvely02 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely11 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely12 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely04 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely05 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely17 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely14 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely15 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely16 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely07 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely08 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely13 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely35 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely01 / 16 квіт. — 21 квіт. SM_GOvely03 / 16 квіт. — 21 квіт.	+380671018038	aodnorih@cfg.com.ua

Додаток 4, класифікація препаративних форм пестицидів

Продукти випускаються у рідких та твердих формах. Основні рідкі форми препаратів:

- ВК, ВР — водні розчини
- КС, СК, ВСК — концентрати суспензій
- КЕ — концентрати емульсій
- МКЕ — масляні концентрати емульсій
- ВЕ — водні емульсії
- КД — концентрат, що диспергується
- СЕ — суспоемульсії
- МЕ — мікроемульсії
- ККР — концентрати колоїдних розчинів
- МС — масляні суспензії
- МД — масляні дисперсії
- МК — масляні концентрати
- МКС — мікрокапсульовані суспензії

Найбільш вживані тверді форми препаратів:

- ВДГ — водорозчинні гранули (гранули, що диспергуються у воді)
- КГ — капсульовані гранули
- КП — контактний порошок
- ПЕ — порошок, що емульгується
- ВП — водорозчинний порошок
- ЗП — порошок, що змочується
- Таб — таблетки